

Data: 14-07-2026

Numri: 12 – 14560/1

Shkup

Drejtuar: ISHP/ISHP (private) _____

Lënda: Njoftim

Të nderuar,

Në lidhje me Vendimet për ndryshimin dhe plotësimin e Listës së barnave që mbulohen nga FSSHRMV-ja, të publikuara në Gazetën Zyrtare të RMV-së nr. 128 datë 12.06.2026, Korrigjimi i Vendimit për ndryshimin dhe plotësimin e Listës së barnave që mbulohen nga FSSHRMV të publikuara në Gazetën Zyrtare të RMV-së, nr. 144 datë 01.07.2026 dhe njoftimi i Fondit me nr. 15-13451/1 datë 30.06.2026 dorëzuar te të gjitha institucionet shëndetësore publike dhe private, Ju informojmë si në vijim:

Për barnat **Enoxaparin** (injeksione/tretje për injektim) dhe **Nadroparin** (injeksione/tretje për injektim), **Rivaroxaban** (tableta), për të cilët është i përcaktuar regjim i përshkrimit RS – me rekomandim të mjekut specialistë dhe për të cilët janë të përcaktuara indikacione në Listën Pozitive të Barnave, nevojitet që mjekët specialistë/subspecialistë gjatë lëshimit të rekomandimit për terapi që mbulohen nga Fondi t'i respektojnë indikacionet e përcaktuara, mjekët e zgjedhur t'i përshkruajnë këto barna në recetë në pajtim me indikacionin e përcaktuar nga mjeku specialistë/subspecialistë, ndërsa barnatoret t'iu lëshohen barnat e personave të siguruar në pajtim me indikacionin e përshkruar të formularit të recetës.

Ju informojmë se për shkak se barnat **Enoxaparin dhe Nadroparin** janë të përshfira me vendimin për barnat e shtrenjta, në periudhën e ardhshme Fondi do t'i pranojë recetat për barnat e lëshuara, në lidhje me indikacionin siç është e përshkruar nga mjeku i zgjedhur, ndërsa e përcaktuar në rekomandim nga mjeku specialistë/subspecialistë dhe që është e vendosur në kopjen e raportit/fletë-lëshimit të specialistit të bashkëngjitur në faturën e barnatores. E lartpërmendura i referohet edhe barit **Rivaroxaban**, që nuk përfshihet me vendimin për barnat e shtrenjta, në lidhje me shifrën MKB-10.

Për shkak se periudhën e kaluar, Fondi hasi shumë pyetje nga ISHP (private) barnatoret, si dhe nga personat e siguruar të cilët janë ballafaquar me problem gjatë lëshimit përkatësisht mos-lëshimit të barnave në barnatoret më së shumti në lidhje me indikacionet që kanë të bëjnë në “profilaksa” dhe “parandalim”, Ju njoftojmë; se gjatë lëshimit të rekomandimit për terapi me barnat e shënuara do të përdoret shifra sipas MKB 10 – Z92.1 ANAMNEZË PERSONALE PËR PËRDORIM AFATGJATË (AKTUAL) TË ANTIKOAGULANTËVE. Për të gjithë indikacionet e tjera që i referohen shërimit ose trajtimit me barnat e shënuara nga LPB (Shtojca 1 dhe

Shtojca 2) do të përdoret shifra përkatëse nga MKB – 10 Klasifikimi ndërkombëtar i sëmundjeve.

Me respekt,

DREJTOR,
Sasho Klekovski

Përpiloi: farm. dipl. Irena Barutoska
Me pëlqim të: ekon. dipl. Samir Neziri
Miratoi: dr. Silvana Andov

Shtojca 1: Indikacione për Enoxaparin dhe Nadroparin

- Profilaksa e sëmundjeve tromboembolike të venave tek pacientët kirurgjik me rrezik mesatar dhe të lartë, në veçanti tek ata të nënshtruar në intervenim të përgjithshëm kirurgjik, duke e përfshirë kirurgjinë e kancerit.
- Profilaksa e sëmundjeve tromboembolike të venave tek pacientët me sëmundje akute (siç janë dobësia akute e zemrës, insuficienca respiratore, infeksionet e rënda ose sëmundjet reumatike) dhe tek pacientë me lëvizshmëri të zvogëluar gjatë rrezikut të rritur nga tromboembolia venoze.
- Trajtimi i trombozës së thellë venoze (TTHV) dhe embolizmi pulmonar (EP) me përjashtim të embolizmave pulmonare për të cilët me siguri nevojitet terapia trombolitike ose intervenca kirurgjike.

- Trajtim i vazhduar i trombozës së thellë venoze (TTHV) dhe embolizmi pulmonar (EP) dhe parandalimi i thirrjeve të përsëritura të tyre tek pacientët me kancer aktiv.
- Parandalimi i formimit të trombëve tek qarkullimi ekstrakorporal gjatë hemodializës
- Sindromi akut koronar:
- Trajtimi i anginës jostabile ose infarkti akut miokard pa vlerësim të ST segmentit (NSTEMI), në kombinim me aplikim peroral të acidit acetilsalicilik.
- Trajtim i infarktit akut i miokardit me lartësi të ST-segmentit (STEMI), duke i përfshirë pacientët që duhet të trajtohen me trombolitikë ose tek të cilët duhet të zbatohet ndërhyrje pasuese koronare perkutane (PCI).

Shtojca 2: Indikacione për Rivaroxaban

10 mg film tableta të paketuara:

- Parandalimi i tromboembolizmit venoz (TEV) tek pacientët e rritur të nënshtruar në zëvendësim selektiv të ijës dhe gjurit
- Terapia e trombozës së thellë venoze (TTHV) dhe embolizmi pulmonar (EP) dhe parandalimi i TTHV rekurent dhe EP, tek të rriturit 15 mg dhe 20 mg tableta të paketuara:
- Parandalimi i goditjes në tru dhe embolizmi sistematik tek pacientët e rritur me fibrilacion atrial joalvular me një ose më shumë faktorë të rrezikur, siç janë dobësia kongestive e zemrës, hipertension, moshë ≥ 75 vite, diabetes melitus, goditje e mëparshme në tru ose goditje ishemike tranzistuese.
- Terapia e trombozës së thellë venoze (TTHV) dhe embolizmit pulmonar (EP) dhe parandalimi i TTHV rekurent dhe EP), tek të rriturit (për pacientë me EP jostabile hemodinamike).

Popullata pediatrike:

- 15 mg dhe 20 mg tableta të paketuara: terapia e tromboembolizmit venoz (TEV) dhe parandalimi i TEV rekurent tek fëmijët dhe adoleshentët në moshë nën 18 vjeç dhe me peshë prej 30 deri 50 kg pas minimumi 5 ditë nga terapia fillestare me antikoagulantë parenteral
- 20 mg tableta të paketuara: terapia e tromboembolizmit venoz (TEV) dhe parandalimi i TEV rekurent tek fëmijët dhe adoleshentët në moshën nën 18 vjeç dhe me peshë mbi 50 kg pas minimumi 5 ditë nga terapia fillestare me antikoagulantë parenteral.